

4. HILBERTIN AVARUUDET

Hilbertin avaruudet ovat ääretönulotteisista normiavaruuksista ominaisuuksiltaan kaikkein lähinnä ”kotiavaruutta” \mathbb{R}^n tai \mathbb{C}^n . Tästä syystä niiden teoria on joustava ja käyttökelpoinen monessa tilanteessa. Hilbertin avaruuden normi määräytyy *sisätulosta*.

4.1. Määritelmä. Olkoon E vektoriavaruus, jonka skalaarikuntana on \mathbb{K} . Kuvaus $f: E \times E \rightarrow \mathbb{K}$ on *Hermiten muoto*, jos

- (i) $f(x_1 + x_2, y) = f(x_1, y) + f(x_2, y)$ kaikilla $x_1, x_2, y \in E$,
- (ii) $f(\lambda x, y) = \lambda f(x, y)$ kaikilla $x, y \in E$ ja $\lambda \in \mathbb{K}$
- (iii) $f(y, x) = \overline{f(x, y)}$ kaikilla $x, y \in E$. Tässä \bar{z} on kompleksiluvun $z \in \mathbb{C}$ kompleksikonjugaatti.

Huomautus.

1. Jos $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, niin ehto (iii) voidaan kirjoittaa muodossa $f(y, x) = f(x, y)$ kaikilla $x, y \in E$

2. Suoraan laskemalla nähdään, että

$$f(x, y_1 + y_2) = \overline{f(y_1 + y_2, x)} \stackrel{(i)}{=} \overline{f(y_1, x) + f(y_2, x)} = \overline{f(y_1, x)} + \overline{f(y_2, x)} = f(x, y_1) + f(x, y_2)$$

ja

$$f(x, \lambda y) = \overline{f(\lambda y, x)} \stackrel{(ii)}{=} \overline{\lambda f(y, x)} = \bar{\lambda} \overline{f(y, x)} = \bar{\lambda} f(x, y)$$

kaikilla $x, y_1, y_2 \in E$ ja $\lambda \in \mathbb{K}$. Hermiten muoto f on siis *konjugaattilineaarinen* jälkimmäisen muuttujan suhteen.

3. Nolla-alkion tapauksessa $f(\bar{0}, y) = 0 = f(x, \bar{0})$ kun $x, y \in E$, sillä $2f(\bar{0}, y) = f(2 \cdot \bar{0}, y) = f(\bar{0}, y)$.

Hermiten muoto $f: E \times E \rightarrow \mathbb{K}$ on *sisätulo* (tai skalaaritulo) avaruudessa E , jos f on lisäksi *aidosti positiivinen* eli

$$f(x, x) \geq 0 \text{ kaikilla } x \in E \text{ sekä } f(x, x) = 0 \text{ joss } x = \bar{0}.$$

Sisätulon tapauksessa merkitsemme:

$$\begin{aligned} (x | y) &= f(x, y), & x, y \in E \\ \|x\| &= \sqrt{(x | x)}, & x \in E. \end{aligned}$$

Joskus käytämme sisätulolle myös merkintää (x, y) .

Vektoriavaruus E on *sisätuloavaruus*, jos E on varustettu sisätulolla $(\cdot | \cdot)$.

4.2. Lause (Cauchy–Schwarzin epäyhtälö). *Sisätuloavaruudessa E pätee*

$$(CS) \quad |(x|y)| \leq \|x\| \|y\| \quad \text{kaikilla } x, y \in E.$$

Todistus. Voidaan olettaa $x \neq \bar{0}$, $y \neq \bar{0}$ (muuten (CS) on ilmeinen). Jokaisella $\lambda \in \mathbb{K}$ pätee

$$\begin{aligned} 0 &\leq (x + \lambda y | x + \lambda y) \stackrel{(i)-(iii)}{=} (x|x) + \lambda(y|x) + \bar{\lambda}(x|y) + \underbrace{\lambda\bar{\lambda}}_{=|\lambda|^2}(y|y) \\ &\stackrel{(iii)}{=} \|x\|^2 + \lambda\overline{(x|y)} + \bar{\lambda}(x|y) + |\lambda|^2\|y\|^2. \end{aligned}$$

Valitaan $\lambda = -\frac{(x|y)}{\|y\|^2}$. On hyvä huomata, että tapauksessa $\mathbb{K} = \mathbb{R}$ polynomien $\lambda \mapsto \|x\|^2 + 2\lambda(x|y) + \lambda^2\|y\|^2$ minimikohta! Tällä valinnalla edellisestä epäyhtälöstä saadaan

$$\begin{aligned} 0 &\leq \|x\|^2 - \frac{2|(x|y)|^2}{\|y\|^2} + \frac{|(x|y)|^2}{\|y\|^4}\|y\|^2 = \|x\|^2 - \frac{|(x|y)|^2}{\|y\|^2} \\ &\iff |(x|y)|^2 \leq \|x\|^2\|y\|^2, \end{aligned}$$

mikä osoittaa väitteen. □

4.3. Seuraus. *Kuvaus $\|x\| = \sqrt{(x|x)}$, $x \in E$, on sisätuloavaruuden E normi.*

Todistus. Osoitetaan ensin kolmioepäyhtälö. Suoraan laskemalla ja käyttämällä identiteettiä $z + \bar{z} = 2 \operatorname{Re} z$, joka on voimassa kaikilla kompleksiluvuilla $z \in \mathbb{C}$, saadaan

$$\begin{aligned} 0 &\leq \|x + y\|^2 = (x + y | x + y) \stackrel{(i)-(iii)}{=} \|x\|^2 + (x|y) + (y|x) + \|y\|^2 \\ &= \|x\|^2 + (x|y) + \overline{(x|y)} + \|y\|^2 \\ &= \|x\|^2 + 2 \operatorname{Re}(x|y) + \|y\|^2 \end{aligned}$$

Koska kompleksiluvuilla $z \in \mathbb{C}$ on aina $\operatorname{Re} z \leq |z|$, niin edellisen epäyhtälön ja Cauchy–Schwarzin epäyhtälön nojalla

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 &\leq \|x\|^2 + 2|(x|y)| + \|y\|^2 \\ &\stackrel{(CS)}{\leq} \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2 \end{aligned}$$

Ottamalla neliöjuuri saadaan $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$, kun $x, y \in E$. Edelleen, kun $x \in E$ ja $\lambda \in \mathbb{K}$, on selvästi voimassa

$$\|\lambda x\| = \sqrt{(\lambda x | \lambda x)} = \sqrt{\lambda\bar{\lambda}(x|x)} = \sqrt{|\lambda|^2\|x\|^2} = |\lambda|\|x\|.$$

Myös ehto (N3) toteutuu, sillä $\|x\| = \sqrt{(x|x)} = 0$ joss $x = \bar{0}$, sillä $(\cdot|\cdot)$ on sisätulo. □

4.4. Määritelmä. Sanomme, että täydellinen sisätuloavaruus $(E, (\cdot | \cdot))$ on *Hilbertin avaruus*.

Hilbertin avaruuden nimitys tulee David Hilbertin (1862–1943) mukaan.

4.5. Esimerkki.

1. Jos $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{K}^n$ ja $y = (y_1, \dots, y_n) \in \mathbb{K}^n$, niin kuvaus

$$(x | y) = \sum_{j=1}^n x_j \bar{y}_j$$

on vektoriavaruuden \mathbb{K}^n sisätulo. Vastaava normi

$$\|x\|_2 = \sqrt{(x | x)} = \sqrt{|x_1|^2 + |x_2|^2 + \dots + |x_n|^2}$$

on avaruuden \mathbb{K}^n tavallinen euklidinen normi ja $(\mathbb{K}^n, \|\cdot\|_2)$ on Hilbertin avaruus. Merkitään usein $\ell_2^n = (\mathbb{K}^n, \|\cdot\|_2)$, $n = 1, 2, \dots$

2. Jonoavaruudessa ℓ^2 määritellään sisätulo kaavalla

$$(*) \quad (x | y) = \sum_{j=1}^{\infty} x_j \bar{y}_j, \text{ kun } x = (x_k), y = (y_k) \in \ell^2.$$

Sisätulon määräämä normi on

$$\|x\|_2 = \left(\sum_{k=1}^{\infty} |x_k|^2 \right)^{\frac{1}{2}}, \text{ kun } x = (x_k) \in \ell^2,$$

eli avaruuden ℓ^2 tavallinen normi, jonka suhteen ℓ^2 on täydellinen (Katso Lause 3.23 sivulla 34). Siis $(\ell^2, \|\cdot\|_2)$ on Hilbertin avaruus.

Huomautus. Jonoavaruuksien Hölderin epäyhtälön 2.17 tai Schwarzin epäyhtälön 2.18 nojalla

$$\sum_{k=1}^{\infty} |x_k \bar{y}_k| \leq \left(\sum_{k=1}^{\infty} |x_k|^2 \right)^{\frac{1}{2}} \left(\sum_{k=1}^{\infty} |y_k|^2 \right)^{\frac{1}{2}} < \infty, \text{ kun } (x_k), (y_k) \in \ell^2,$$

joten sarja $\sum_{k=1}^{\infty} x_k \bar{y}_k$ suppenee (itseisesti) \mathbb{K} :ssa (ja $(*)$ on järkevä).


3. Jos avaruus $C(0, 1) = \{ f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{K} : f \text{ jatkuva} \}$ varustetaan sisätulolla

$$(f | g) = \int_0^1 f(t) \overline{g(t)} dt, \quad f, g \in C(0, 1),$$

niin $(C(0, 1), \|\cdot\|_2)$ ei ole Hilbertin avaruus, missä

$$\|f\|_2 = \left(\int_0^1 |f(t)|^2 dt \right)^{\frac{1}{2}},$$

sillä $(C(0, 1), \|\cdot\|_2)$ ei ole täydellinen. Perusteluksi tarkastele seuraava kuva ja pohdi, mitä tapahtuu, kun $n \rightarrow \infty$.



KUVA 4. Jatkuva funktio f_n , joka approksimoi epäjatkovaa funktiota $\|\cdot\|_2$ -normissa

4. Olkoon $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ Lebesgue-mitallinen joukko. Tällöin avaruus $L^2(\Omega)$ varustettuna sisätulolla

$$(4.6) \quad (f | g) = \int_{\Omega} f(x) \overline{g(x)} dx, \quad f, g \in L^2(\Omega),$$

on Hilbertin avaruus (normissa $\|f\|_2 = (\int_{\Omega} |f(x)|^2 dx)^{\frac{1}{2}}$, vrt. Lause 3.31 sivulla 39).

Huomaa että tulofunktio $f(x)\overline{g(x)}$ on integroituva ja (4.6) siis hyvin määritelty kun f ja $g \in L^2(\Omega)$; tämä seuraa integraalien Hölderin epäyhtälöstä (Lemma 3.25 sivulla 37).

Kun verrataan kahta viimeistä esimerkkiä, käy ilmi, että $C(0, 1)$ on tiheä avaruudessa $(L^2(0, 1), \|\cdot\|_2)$ ja siten $L^2(0, 1)$ on vektoriavaruuden $C(0, 1)$ *täydentyminen* $\|\cdot\|_2$ -normin suhteen. Tämä osoitetaan myöhemmin kurssin aikana (kts. Lause 5.5 luvussa 5)

Alamme sitten setvimään Hilbertin avaruuksien ominaisuuksia. Havaitaan, että (geo)metrisesti ne toimivat kuten kotiavaruus \mathbb{K}^n . Emme kuitenkaan voi vedota äärellisulotteisiin ilmiöihin, mutta esimerkiksi kahden annetun vektorin välinen kulma on järkevä Hilbertin avaruudessa:

Jos $x, y \neq \bar{0}$ ovat \mathbb{R} -kertoimisen Hilbertin avaruuden E alkioita, niin määrittellemme niiden välisen kulman $\varphi \in [0, 2\pi)$ tutulla kaavalla

$$(x | y) = \|x\| \|y\| \cos \varphi.$$

Olkoon vaikkapa $x = (2^{-n})_1^{\infty}$ ja $y = (3^{-n})_1^{\infty} \in \ell^2$. Tällöin

$$(x | y) = \sum_{n=1}^{\infty} x_n \overline{y_n} = \sum_{n=1}^{\infty} 6^{-n} = 1/5$$

ja koska $\|x\|_2 = \sqrt{\sum (2^{-n})^2} = 1/\sqrt{3}$ ja vastaavasti $\|y\|_2 = 1/\sqrt{8}$, on

$$\cos \varphi = \frac{\sqrt{24}}{5} \Rightarrow \varphi \sim 11^\circ$$

Funktioiden välisiä kulmia pohdittaessa kaikkein helpoin on tilanne, jossa vektorit ovat kohtisuorassa. Tätä teemaa kannattaa kehittää vähän pitemmällekin:


4.7. Määritelmä. Sisätuloavaruuden E vektorit $x, y \in E$ ovat *ortogonaaliset* (eli *kohtisuorat*), jos $(x|y) = 0$. Ortogonaalisuutta merkitään $x \perp y$. Osajoukot $A, B \subset E$ ovat *ortogonaaliset*, merkitään $A \perp B$, jos $x \perp y$ kaikilla $x \in A$ ja $y \in B$.

Ortogonaalisten vektorien summilla on seuraava tuttu ominaisuus. Hilbertin avaruuksien hajotelmia konstruoitaessa sillä tulee olemaan tärkeä rooli.

4.8. Lause (Pythagoras). *Olkoon E sisätuloavaruus. Jos $\{x_1, \dots, x_n\} \subset E$ ja vektorit ovat keskenään ortogonaaliset eli $x_j \perp x_k$, kun $j \neq k$, niin*

$$\|x_1 + x_2 + \dots + x_n\|^2 = \|x_1\|^2 + \|x_2\|^2 + \dots + \|x_n\|^2.$$

Huomautus. Kun kolmiossa $a = \|x\|$ ja $b = \|y\|$, niin $c = \sqrt{\|x\|^2 + \|y\|^2}$, joten tapaus $n = 2$ on alkeisgeometriasta tuttu lause $a^2 + b^2 = c^2$.



Todistus. Väite osoitetaan induktiolla muuttujan n suhteen. Kun $n = 2$ ja $x \perp y$ niin,

$$\|x + y\|^2 = (x + y | x + y) = \|x\|^2 + (x | y) + (y | x) + \|y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2.$$

Oletetaan, että väite on osoitettu, kun $n = k$. Tällöin kohdan $n = 2$ ja induktiooletuksen nojalla on voimassa

$$\begin{aligned} \|x_1 + \dots + x_k + x_{k+1}\|^2 &= \|x_1 + \dots + x_k\|^2 + \|x_{k+1}\|^2 \\ &\stackrel{\text{ind.ol.}}{=} \|x_1\|^2 + \dots + \|x_k\|^2 + \|x_{k+1}\|^2, \end{aligned}$$

Ensimmäinen yhtäsuuruus on voimassa, sillä

$$(x_1 + \dots + x_k | x_{k+1}) = \sum_{j=1}^k (x_j | x_{k+1}) = 0,$$

eli $(x_1 + \dots + x_k) \perp x_{k+1}$. □

Tilanteissa, joissa avaruuden vektoripari ei ole kohtisuorassa, voimme korvata Pythagoraan suunnikasyhtälöllä. (Piirrä ao. lauseesta esimerkkikuva!)

4.9. Lause (Suunnikasyhtälö). *Jos E on sisätuloavaruus ja $x, y \in E$, niin*

$$\|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$$

Todistus. Lasketaan suoraan

$$\begin{aligned} \|x + y\|^2 + \|x - y\|^2 &= (x + y | x + y) + (x - y | x - y) \\ &= (x | x) + (x | y) + (y | x) + (y | y) \\ &\quad + (x | x) - (x | y) - (y | x) + (y | y) \\ &= 2(\|x\|^2 + \|y\|^2) \end{aligned}$$

□

Suunnikasyhtälön avulla voidaan helposti tarkistaa, että monet konkreettiset Banachin avaruudet *eivät* ole Hilbertin avaruuksia (eli normi *ei* voi tulla sisätulosta).

4.10. Esimerkki. $(\ell^1, \|\cdot\|_1)$ ja $(C(0, 1), \|\cdot\|_\infty)$ eivät ole Hilbertin avaruuksia.

Ratkaisu: Olkoon $x = (1, 0, 0, \dots)$, $y = (0, 1, 0, \dots) \in \ell^1$. Tällöin

$$\begin{aligned} \|x + y\|_1 &= \|(1, 1, 0, \dots)\|_1 = 2, \\ \|x - y\|_1 &= \|(1, -1, 0, \dots)\|_1 = 2, \\ \|x\|_1 &= \|y\|_1 = 1, \end{aligned}$$

joten

$$\|x + y\|_1^2 + \|x - y\|_1^2 = 2^2 + 2^2 = 8 \neq 4 = 2(\|x\|_1^2 + \|y\|_1^2).$$

Siispä ℓ^1 ei ole sisätuloavaruus. Olkoon nyt $h: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$h(x) = \begin{cases} x, & \text{kun } 0 \leq x \leq \frac{1}{4}, \\ \frac{1}{2} - x, & \text{kun } \frac{1}{4} < x \leq \frac{1}{2}, \\ 0, & \text{kun } x > \frac{1}{2}. \end{cases}$$

Asetetaan $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = h(x)$ ja $g: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $g(x) = h(x - \frac{1}{2})$. Tällöin $f, g \in C(0, 1)$ ja $\|f\|_\infty = \|g\|_\infty = \frac{1}{4}$. Lisäksi $\|f + g\|_\infty = \|f - g\|_\infty = \frac{1}{4}$, joten

$$\|f + g\|_\infty + \|f - g\|_\infty = \frac{1}{8} \neq \frac{1}{4} = 2(\|f\|_\infty + \|g\|_\infty).$$

Siispä $(C(0, 1), \|\cdot\|_\infty)$ ei myöskään ole sisätuloavaruus. □

4.11. **Määritelmä.** Jos $A \subset E$, niin joukon A ortokomplementti A^\perp on joukko

$$A^\perp := \{ y \in E : (x | y) = 0 \text{ kaikilla } x \in A \}.$$

Ortokomplementin ominaisuuksia varten tarvitsemme seuraavan aputuloksen.

4.12. **Lause.** Ehto $(x, y) \mapsto (x | y)$ määrää jatkuvan kuvauksen $E \times E \rightarrow \mathbb{K}$.

Todistus. Jos $x_0 \in E$ ja $y_0 \in E$, niin kolmioepäyhtälön ja Cauchy–Schwarzin epäyhtälön nojalla

$$\begin{aligned} |(x | y) - (x_0 | y_0)| &= |(x - x_0 | y - y_0) + (x - x_0 | y_0) + (x_0 | y - y_0)| \\ &\leq \|x - x_0\| \|y - y_0\| + \|x_0 - x\| \|y_0\| + \|x_0\| \|y - y_0\|, \end{aligned}$$

missä oikea puoli $\rightarrow 0$, kun $x \rightarrow x_0$ ja $y \rightarrow y_0$. \square

Käy ilmi, että monimutkaisenkkin osajoukon A ortokomplementti on hyvin säännöllinen:

4.13. **Lause.** Jos $A \subset E$, niin sen ortokomplementti A^\perp on avaruuden E suljettu aliavaruus.

Todistus. Joukko A^\perp on avaruuden E aliavaruus: Jos $y_1, y_2 \in A^\perp$, niin

$$(x | y_1 + y_2) = (x | y_1) + (x | y_2) = 0 + 0 = 0$$

kaikilla $x \in A$, joten $y_1 + y_2 \in A^\perp$. Vastaavasti

$$(x | \lambda y_1) = \bar{\lambda}(x | y_1) = 0$$

kaikilla $x \in A$, joten $\lambda y_1 \in A^\perp$. Siispä A^\perp on aliavaruus.

Seuraavaksi huomataan, että jos $x \in E$ niin x^\perp on jatkuvan funktion $y \mapsto (x | y)$ alkukuva nollasta. Siispä joukko x^\perp on suljettu. Näin ollen mielivaltaisella $A \subset E$,

$$A^\perp = \bigcap_{x \in A} x^\perp$$

on suljettujen joukkojen leikkauksena suljettu. \square

Huomautus.

- a) Nolla-alkion $\bar{0}$ ortokomplementti on E eli $\{\bar{0}\}^\perp = E$.
- b) Koko avaruuden E ortokomplementti on $\{\bar{0}\}$ eli $E^\perp = \{\bar{0}\}$. Tämä seuraa siitä, että jos $y \in E^\perp$, niin $(x | y) = 0$ kaikilla $x \in E$. Erityisesti $(y | y) = \|y\|^2 = 0$, joten $y = \bar{0}$.
- c) Sama päättely antaa: jos $y \in A \cap A^\perp$, niin $y = \bar{0}$.

Olemme osoittaneet myös seuraavan hyödyllisen havainnon.

4.14. Lause. Jos $(x | y_1) = (x | y_2)$ kaikilla $x \in E$, niin $y_1 = y_2$.

Todistus. Koska $0 = (x | y_1 - y_2)$ kaikilla $x \in E$, niin $y_1 - y_2 \in E^\perp = \{\bar{0}\}$. \square

Seuraavaksi alamme tarkastella minimointitehtäviä. Näillä on monia sovelluksia, esimerkiksi differentiaaliyhtälöistä aina käytännön prosessien optimointiin asti. Kun tilanteita mallinnetaan Hilbertin avaruuksilla tulee tehtäväksi selvittää, millä ehdoin joukoista löytyy minimoivia alkioita. Koska avaruutemme ovat ääretönulotteisia, minimien olemassaolo ei ole ollenkaan selvää, kuten seuraava yksinkertainen esimerkki näyttää.

4.15. Esimerkki. Olkoon $e_n = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0) \in \ell^2$; siis jonon n :s termi = 1. Jos $A = \{ \frac{n+2}{n+1} e_n : n \in \mathbb{N} \}$, tällöin A on suljettu ja rajoitettu; kuitenkin ei löydy sellaista vektoria $x \in A$, jolle olisi


$$\|x\| = \inf \{ \|y\| : y \in A \} = 1.$$

Joukkojen kompaktisuus tietysti takaisi minimoivien alkioiden olemassaolon, mutta ääretönulotteisissa avaruuksissa tämä oletus olisi aivan liian rajoittava. On itse asiassa yllättävää, että Hilbertin avaruuksissa minimointitehtävä ratkeaa suhteellisen yleisesti. Olemmainen ominaisuus tällaisissa minimointitehtävissä on *konveksisuus*.

Muistetaan, että pisteiden x ja y välinen *yhdysjana* on joukko

$$\{ x + t(y - x) : t \in [0, 1] \} = \{ tx + (1 - t)y : t \in [0, 1] \}.$$

4.16. Määritelmä. Vektoriavaruuden E osajoukko A on *konvekssi*, jos pisteiden $x, y \in A$ yhdysjana aina sisältyy joukkoon A eli jos $tx + (1 - t)y \in A$ aina, kun $x, y \in A$ ja $0 \leq t \leq 1$.



KUVA 5. Konvekssi joukko (vasemmalla) ja ei-konvekssi joukko (oikealla); Kuvassa myös pisteiden x ja y väliset yhdysjanat.

4.17. Lause. Jos F on Hilbertin avaruuden E konvekssi suljettu osajoukko, niin on olemassa täsmälleen yksi normin minimoiva alkio $x_0 \in F$, eli alkio $x_0 \in F$ joka toteuttaa ehdon

$$\|x_0\| \leq \|x\| \text{ kaikilla } x \in F.$$

Todistus. Olkoon $\delta = \inf\{\|x\| : x \in F\}$.

Sovelletaan suunnikasyhtälöä

$\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$ vektoreihin $\frac{1}{2}x, \frac{1}{2}y$, kun $x, y \in F$. Tästä seuraa, että

$$\frac{1}{4}\|x-y\|^2 = \frac{1}{2}\|x\|^2 + \frac{1}{2}\|y\|^2 - \left\|\frac{x+y}{2}\right\|^2.$$

Koska konveksisuuden nojalla $\frac{1}{2}(x+y) \in F$, niin


$$(*) \quad \|x-y\|^2 \leq 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2 - 4\delta^2.$$

Jos nyt $\|x\| = \|y\| = \delta$, niin arvion (*) nojalla $\|x-y\|^2 \leq 0$, joten $x = y$. Siis normin minimoiva alkio on ainakin yksikäsitteinen, jos se on olemassa.

Olemassaoloa varten valitaan sellainen jono $(x_n)_{n=1}^\infty \subset F$, että $\|x_n\| \rightarrow \delta$, kun $n \rightarrow \infty$. Korvataan x ja y arviossa (*) jonon alkioilla x_n ja x_m . Silloin $\|x_n - x_m\| \rightarrow 0$, kun $n, m \rightarrow \infty$. Siispä $(x_n)_{n=1}^\infty$ on Cauchyn jono Hilbertin avaruudessa E , joten $x_n \rightarrow x_0 \in E$, kun $n \rightarrow \infty$. Koska normi on jatkuva funktio, niin

$$\|x_0\| = \lim_{n \rightarrow \infty} \|x_n\| = \delta.$$

Koska F on suljettu ja $(x_n)_{n=1}^\infty \subset F$, niin raja-alkio $x_0 \in F$. □



KUVA 6. Minimointiongelman yksikäsitteisyyden geometrinen ajatus konveksille joukolle (vasemmalla) ja ei-konveksille joukolle (oikealla)

Edellinen lause voidaan muotoilla myös invariantisti, niin ettei origolla ole erikoisasemaa.

4.18. Seuraus. Olkoon E Hilbertin avaruus, F sen suljettu konvekssi osajoukko sekä $x \in E$. Silloin on täsmälleen yksi alkio $y_0 \in F$, jolle

$$\|x - y_0\| = \text{dist}(x, F)$$

Tässä $\text{dist}(x, F) = \inf\{\|x - y\| : y \in F\}$ on x :n etäisyys F :stä.

Todistus. Joukko $x - F$ on suljettu ja konvekssi, sekä


$$\min\{\|x - y\| : x - y \in x - F\} = \min\{\|x - y\| : y \in F\}.$$

Nyt väite seuraa suoraan Lauseesta 4.17. □

Yo. lauseilla on suoraan sovelluksia konveksissa optimoinnissa, mutta niitä voidaan käyttää monissa muissakin minimointitehtävissä, esim. variaatiolaskennassa.

Olemme todistaneet minimoivan alkion y_0 olemassaolon ja yksikäsitteisyyden, mutta se voidaan myös helposti tunnistaa! Seuraava lause kertoo, että $\|x - y\| = \text{dist}(x, F)$ jos ja vain jos vektoreiden $x - y$ ja $z - y$ välinen kulma on tylppä kaikilla $z \in F$.

[Muista, että (\mathbb{R} -kertoimisessa) Hilbertin avaruudessa kahden vektorin a ja b välinen kulma $\varphi \in [0, 2\pi)$ saatiin ehdosta $(a | b) = \|a\| \|b\| \cos \varphi$.]



KUVA 7. vasemmalla tylppä kulma; oikealla terävä

4.19. Lause. Olkoon E Hilbertin avaruus sekä $F \subset E$ sen suljettu konvekssi ja epätyhjä osajoukko. Olkoon myös $x \in E$ ja $y \in F$.

Tällöin $\|x - y\| = \text{dist}(x, F) \Leftrightarrow$ kaikilla $z \in F$ pätee $\text{Re}(x - y | z - y) \leq 0$.

Todistus. Olkoon $\|x - y\| = \text{dist}(x, F)$. Jos $z \in F$ ja $0 < \lambda < 1$, niin konveksisuuden nojalla $y + \lambda(z - y) \in F$. Siispä

$$\|x - y - \lambda(z - y)\|^2 \geq \|x - y\|^2,$$

eli

$$\|x - y\|^2 - 2\lambda \operatorname{Re}(x - y | z - y) + |\lambda|^2 \|z - y\|^2 \geq \|x - y\|^2.$$

Saamme tästä $\operatorname{Re}(x - y | z - y) \leq (\lambda/2)\|z - y\|^2$ kaikilla $0 < \lambda < 1$. Antamalla $\lambda \rightarrow 0$ nähdään, että $\operatorname{Re}(x - y | z - y) \leq 0$.

Oletetaan sitten, että $\operatorname{Re}(x - y | z - y) \leq 0$ kaikilla $z \in F$. Siis

$$\begin{aligned} \|x - z\|^2 &= \|x - y - (z - y)\|^2 \\ &= \|x - y\|^2 - 2\operatorname{Re}(x - y | y - z) + \|z - y\|^2 \\ &\geq \|x - y\|^2 \end{aligned}$$

kaikilla $z \in F$. Silloin y on normin minimoiva alkio, joten $\|x - y\| = \operatorname{dist}(x, F)$. Lause on näin todistettu. \square

ORTOGONAALISET PROJEKTIOT

Sovellamme seuraavaksi minimointilauseetta 4.18 tapaukseen, missä F on suljettu vektorialiavaruus. Tämä johtaa ortoprojektioihin, jotka tulevat olemaan lineaarisia kuvauksia.

4.20. Lause. *Olkoon E Hilbertin avaruus ja M sen suljettu vektorialiavaruus. Kun $x \in E$ ja $y \in M$,*

$$\|x - y\| = \operatorname{dist}(x, M) \quad \Leftrightarrow \quad (x - y) \perp M.$$

Todistus. Olkoon ensin $\|x - y\| = \operatorname{dist}(x, M)$. Jos $z \in M$ sekä $\lambda \in \mathbb{K}$, niin lineaarinen yhdiste $y + \lambda z \in M$ ja Lauseen 4.19 nojalla

$$0 \geq \operatorname{Re}((x - y | (y + \lambda z) - y)) = \operatorname{Re}(\bar{\lambda}(x - y | z))$$

kaikilla $\lambda \in \mathbb{K}$. Kun valitaan $\lambda = (x - y | z)$, niin tästä seuraa, että

$$|(x - y | z)|^2 \leq 0$$


eli $(x - y | z) = 0$ kaikilla $z \in M$. Toisin sanoen, $x - y \in M^\perp$.

Oletetaan nyt, että $x - y \in M^\perp$. Jos $z \in M$, niin $z - y \in M$ ja siten $0 = \operatorname{Re}(x - y | z - y)$ kaikilla $z \in M$. Lauseen 4.19 nojalla tästä seuraa, että $\|x - y\| = \operatorname{dist}(x, M)$. \square

Kun M on avaruuden E suljettu vektorialiavaruus, olkoon $P_M: E \rightarrow E$ kuvaus, joka liittää vektoriin x sen yksikäsitteisen vektorin $y \in M$, joka minimoi x :n etäisyyden M :ään. Siis

$$(4.21) \quad P_M(x) = y, \quad \text{kun } \|x - y\| = \operatorname{dist}(x, M)$$

Sanomme, että kuvaus P_M on avaruuden E ortoprojektio aliavaruudelle M ja $y = P_M x$ on vektorin x ortoprojektio avaruudelle M .



Huomautus. Havaitaan lisäksi, että Lause 4.20 antaa seuraavanlaisen tavan karakterisoida vektorin x ortoprojektio:

$$(4.22) \quad y = P_M x \quad \text{joss} \quad y \in M \quad \text{ja} \quad x - y \perp M.$$

Toisin sanoen, ehdon (4.22) mukaan ortoprojektion määräävät seuraavat kaksi ehtoa,

$$(4.23) \quad P_M x \in M \quad \text{ja} \quad P_M x - x \in M^\perp$$

jotka ovat siis voimassa kaikilla Hilbert avaruuden E vektoreilla x .

Ylläolevista tuloksista saadaan erityisesti

$$(4.24) \quad P_M x = \bar{0} \quad \text{kun} \quad x \in M^\perp, \quad P_M x = x \quad \text{kun} \quad x \in M$$

Jos nimittäin $x \in M^\perp$, niin $P_M x = (P_M x - x) + x \in M^\perp$, ja siis $P_M x \in M \cap M^\perp = \{\bar{0}\}$. Jälkimmäinen väite seuraa suoraan määritelmästä (4.21).

Määrittelimme yllä ortoprojektion puhtaasti *metrisenä* suureena, mutta Hilbert avaruuden vektoriavaruus-struktuurin takia päädyimme lineaariseen operaattoriin.

4.25. Lause. *Olkoon M suljettu vektorialiavaruus Hilbertin avaruudessa E . Silloin ortoprojektio $P_M : E \rightarrow E$ on lineaarinen kuvaus.*

Todistus. Lineaarisuuden havaitsemiseksi käytetään esitystä

$$x + \lambda y = \underbrace{P_M x + \lambda P_M y}_{:=z \in M} + \underbrace{(x - P_M x) + \lambda(y - P_M y)}_{\in M^\perp},$$

kun $x, y \in E$ ja $\lambda \in \mathbb{K}$. Esityksestä nähdään, että $x + \lambda y - z \perp M$ ja $z \in M$, joten ehdon (4.22) nojalla $P_M(x + \lambda y) = z = P_M x + \lambda P_M y$. Siis P_M on lineaarinen. \square

Lineaarialgebrasta muistamme, että lineaarikuvaus $P : E \rightarrow E$ on *projektio*, jos $P^2 = P$. Mikäli $U = P(E)$ ja $V = \ker P$, sanomme että P on projektio avaruudelle U suuntaan V .

Läheinen lineaarialgebran käsite on nk. suora summa. Sanomme, että E on aliavaruuksien U ja V suora summa, merkitään $E = U \oplus V$, jos $E = U + V$ ja $U \cap V = \{\bar{0}\}$. Voidaan osoittaa, että jos P on projektio avaruudelle U suuntaan V , niin $E = U \oplus V$. Ja kääntäen, jos $E = U \oplus V$, niin suora summa määrittelee projektion P avaruudelle U suuntaan V . Nimittäin silloin jokaisella $x \in E$ on yksikäsitteinen esitys $x = u + v$, missä $u \in U$ ja $v \in V$. Asetetaan tällöin $P(x) = u$; nyt $U = P(E)$ ja $V = \ker P$ [Näiden väitteiden (helpot) yksityiskohdat jätetään ylimääräiseksi harjoitustehtäväksi].

4.26. Lause. Jos M on Hilbertin avaruuden E suljettu vektorialiavaruus, niin $E = M \oplus M^\perp$ ja P_M on avaruuden E projektio aliavaruudelle M suuntaan M^\perp .
Lisäksi

$$\|P_M x\| \leq \|x\| \quad \text{kaikilla } x \in E.$$

Todistus. Lauseesta 4.13 sivulla 57 muistetaan, että M^\perp on avaruuden E vektorialiavaruus. Lisäksi (4.23) osoitti että jokainen $x \in E$ voidaan hajottaa summaksi $x = P_M x + x - P_M x$, missä $P_M x \in M$ ja $x - P_M x \in M^\perp$. Siis $E = M + M^\perp$. Edelleen havaitaan, että tämä summa on suora: jos $x \in M \cap M^\perp$, niin $\|x\|^2 = (x|x) = 0$, joten $x = \bar{0}$. Siispä $M \cap M^\perp = \{\bar{0}\}$ ja $E = M \oplus M^\perp$.

Seuraavaksi tarkastellaan esitystä $x = P_M x + z$, missä $z = x - P_M x \in M^\perp$. Koska edellä osoitimme että $P_M z = \bar{0}$, niin lineaarisuuden avulla saadaan

$$P_M x = P_M(P_M x + z) = P_M^2 x + P_M z = P_M^2 x.$$

Siis P_M on projektio. Ehto $P_M(E) = M$ seuraa kaavasta (4.22) [valitaan $y = x$], samoin ehto $\ker(P_M) = M^\perp$ [kun valitaan $y = 0$].

Lopuksi, normiarviota varten käytetään Pythagoras'n lausetta,

$$\|x\|^2 = \|P_M x + (x - P_M x)\|^2 = \|P_M x\|^2 + \|x - P_M x\|^2 \geq \|P_M x\|^2,$$

joten väite seuraa. □

4.27. Huomautus. Lauseesta 4.26 seuraa myös, että ortoprojektio P_M on jatkuva, ja että itse asiassa $\|P_M\| = 1$ kun $M \neq E$ (Miksi ?!).

ORTONORMAALIT KANNAT

4.28. Määritelmä. Sisätuloavaruuden jono (e_n) on *ortonormitettu*, jos

$$(e_i | e_j) = \begin{cases} 0, & i \neq j \\ 1, & i = j. \end{cases}$$

Toisin sanoen, jono (e_j) on ortonormeerattu, jos sen vektorit ovat pareittain kohtisuorassa ja $\|e_j\| = 1$ jokaisella j .

4.29. **Esimerkki.**

- a) Kanoniset kantavektorit $e_n = (0, \dots, 0, 1, 0, \dots, 0) \in \ell^2$, missä nolasta eroava termi on n :s, $n \in \mathbb{N}$, muodostavat ortonormitetun jonon avaruudessa ℓ^2 .
- b) $E = L^2(0, 2\pi)$ varustettuna sisätulolla

$$(x | y) = \int_0^{2\pi} x(t)\overline{y(t)} dt,$$

on Hilbert avaruus; jono (x_n) ,

$$x_n(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{int} \quad n \in \mathbb{Z},$$

on ortonormitettu jono avaruudessa E (Miksi?).

Ortonormaaleja jonoja ja niiden määräämiä vektorisummia voi helposti kontrolloida tärkeän Besselin epäyhtälön avulla.

Lause (Besselin epäyhtälö). *Jos (e_n) on ortonormeerattu jono Hilbertin avaruudessa E , niin*

$$(B) \quad \sum_{k=0}^{\infty} |(x | e_k)|^2 \leq \|x\|^2$$

kaikilla $x \in E$. Erityisesti,

$$\lim_{k \rightarrow \infty} (x | e_k) = 0.$$

Todistus. Jos (e_n) on ortonormitettu avaruudessa E ja $x \in E$, niin tarkastellaan ensin äärellisiä osasummia. Ottamalla sisätulo termeittäin saadaan

$$(4.30) \quad \left(\sum_{k=0}^n (x | e_k) e_k - x | e_j \right) = (x | e_j) - (x | e_j) = 0, \quad j = 0, \dots, n$$

Toisin sanoen, erotus $x - \sum_{k=0}^n (x | e_k) e_k$ on kohtisuorassa vektoreita e_j vastaan, kaikilla $0 \leq j \leq n$. Siten Pythagoraan lauseen mukaan

$$(4.31) \quad \begin{aligned} \|x\|^2 &= \left\| x - \sum_{k=0}^n (x | e_k) e_k \right\|^2 + \left\| \sum_{k=0}^n (x | e_k) e_k \right\|^2 \\ &\geq \left\| \sum_{k=0}^n (x | e_k) e_k \right\|^2 = \sum_{k=0}^n |(x | e_k)|^2 \end{aligned}$$

Huomaa, että myös viimeinen yhtäsuuruus perustui Pythagoraan lauseeseen (ja siihen että vektorit e_j ovat ortonormeerattuja, $\|e_j\| = 1$ jokaisella j).

Olemme siis näyttäneet, että jokaisella $n \in \mathbb{N}$ pätee

$$\sum_{k=0}^n |(x | e_k)|^2 \leq \|x\|^2$$

Antamalla lopuksi $n \rightarrow \infty$ saadaan Besselin epäyhtälö (B). □

4.32. Määritelmä. Jos (e_n) on ortonormitettu jono Hilbertin avaruudessa E ja $x \in E$, niin lukuja $(x | e_k)$ sanotaan vektorin x *Fourier-kertoimiksi* jonon (e_n) suhteen.

Jos E on vektoriavaruus ja $A \subset E$, niin merkitään $\text{span}(A)$:lla joukon A viritämää avaruuden E vektorialiavaruutta, eli

$$\text{span}(A) := \left\{ \sum_{i=1}^n \lambda_i a_i : n \in \mathbb{N}, \lambda_i \in \mathbb{K}, a_i \in A \right\}.$$

Edelleen $\overline{\text{span}}(A)$ on aliavaruuden $\text{span}(A)$ sulkeuma avaruudessa E .

Olkoon (e_0, \dots, e_n) äärellinen ortonormeerattu jono Hilbertin avaruudessa E . Besselin epäyhtälö pätee tietysti myös tällaiselle jonolle (vrt. yo. todistus); seurauksena saamme

4.33. Lause. *Olkoon E Hilbertin avaruus, $(e_j)_{j=0}^n \subset E$ äärellinen ortonormeerattu jono sekä $M = \text{span}(\{e_0, \dots, e_n\})$. Tällöin*

a) *M on suljettu E :n vektorialiavaruus, $M = \overline{\text{span}}(\{e_0, \dots, e_n\})$.*

b) *M :n ortoprojektiolla on seuraava konkreettinen esitys,*

$$(4.34) \quad Px = \sum_{k=0}^n (x | e_k) e_k, \quad x \in E$$

Todistus. Kaavan (4.34) määrittelemä kuvaus on selvästi lineaarinen. Pythagoraan ja Besselin epäyhtälön nojalla $\|Px\|^2 = \sum_{k=0}^n |(x | e_k)|^2 \leq \|x\|^2$. Siten P on jatkuva.

Toisaalta, jos $x \in M$,

$$x = \sum_{k=0}^n \lambda_k e_k$$

joillakin skalaareilla $\lambda_k \in \mathbb{K}$. Ottamalla tästä sisätulo e_j :n kanssa, saadaan ortogonaalisuuden nojalla $\lambda_j = (x | e_j)$, $j = 0, \dots, n$. Mutta tämä sanoo, että $Px = x$ jokaisella $x \in M$. Niinpä

$$M = \{x \in E : Px = x\} = \ker(I - P),$$

missä I on avaruuden E identtinen kuvaus. Jatkuva kuvauksen ytimenä M on näin ollen suljettu v.a.a.

Lopuksi, kuten yhtälössä (4.30) nähdään, että

$$e_j \perp \left(x - \sum_{k=0}^n (x | e_k) e_k \right) = 0, \quad j = 0, \dots, n,$$

eli yhtäpitävästi $x - Px \in M^\perp$, $x \in E$. Mutta Lauseen 4.20 mukaan ehdot $Px \in M$ ja $x - Px \in M^\perp$ karakterisoivat ortoptojektion; vrt. myös (4.22). Olemme näin todistaneet myös väitteen b). \square

4.35. *Huomautus.* a) Pätee yleisesti: Jokaisessa Banachin avaruudessa jokainen äärellisulotteinen aliavaruus on suljettu [Tähän (ehkä) palataan myöhemmin].

b) Lineaarialgebran kurssilta tunnetulla Gramm-Schmidtin menetelmällä jokaiseen Hilbert-avaruuden äärellisulotteiseen aliavaruuteen M voidaan konstruoida ortonormaali kanta; tällöin Lause 4.33 antaa konkreettisen lausekkeen M :n ortoprojektioille; vrt. myös Harjoitukset 6.

c) Voimme nyt yhdistää Lauseet 4.20 ja 4.33, ja saamme seuraavan tulkinnan: Jokaisella $x \in E$, funktio

$$(\lambda_0, \dots, \lambda_n) \mapsto \left\| x - \sum_0^n \lambda_k e_k \right\|$$

saa pienimmän arvonsa *täsmälleen* (!) silloin, kun

$$\lambda_k = (x | e_k), \quad k = 0, 1, \dots, n.$$

Edelleen, ortonormeeratuista vektoreista muodostettujen sarjojen summautuminen riippuu vain kerroinjonon ominaisuuksista (yleisissä Banach-avaruus summissa tilanne ei ole lainkaan yhtä helppo):

4.36. **Lause.** *Olkoon $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ortonormeerattu jono Hilbertin avaruudessa E . Jos $\lambda_n \in \mathbb{K}$ kaikilla $n \in \mathbb{N}$, niin*

$$\text{sarja } \sum_{k=0}^{\infty} \lambda_k e_k \text{ suppenee jos ja vain jos } \sum_{k=0}^{\infty} |\lambda_k|^2 < \infty.$$

Tällöin pätee

$$\left\| \sum_{k=0}^{\infty} \lambda_k \right\|^2 = \sum_{k=0}^{\infty} |\lambda_k|^2.$$

Todistus. Jos $p, q \in \mathbb{N}$ ja $p < q$, niin Pythagoras'n lauseen nojalla

$$\left\| \sum_{k=0}^q \lambda_k e_k - \sum_{k=0}^p \lambda_k e_k \right\|^2 = \left\| \sum_{k=p+1}^q \lambda_k e_k \right\|^2 = \sum_{k=p+1}^q |\lambda_k|^2.$$

Siis osasummat $s_n = \sum_{k=0}^n \lambda_k e_k$ muodostavat Cauchyn jonon avaruudessa E jos ja vain jos sarja $\sum |\lambda_k|^2$ suppenee. Tämä osoittaa väitteen ensimmäisen osan. Jos nyt

$$x = \sum_{k=0}^{\infty} \lambda_k e_k,$$

niin sisätulon jatkuvuuden nojalla

$$(x | e_j) = \left(\sum_{k=0}^{\infty} \lambda_k e_k | e_j \right) = \sum_{k=0}^{\infty} \lambda_k (e_k | e_j) = \lambda_j,$$

mistä

$$\|x\|^2 = (x | x) = \left(\sum_{k=0}^{\infty} \lambda_k e_k | x \right) = \sum_{k=0}^{\infty} \lambda_k (e_k | x) = \sum_{k=0}^{\infty} \lambda_k \bar{\lambda}_k = \sum_{k=0}^{\infty} |\lambda_k|^2$$

□

4.37. Seuraus (Riesz–Fisherin lause). *Olkoon E Hilbertin avaruus ja $(e_k)_{k \in \mathbb{N}}$ ortonormeerattu jono. Jos $(\lambda_k)_{k=0}^{\infty} \in \ell^2$, niin löytyy sellainen $x \in E$, että*

$$(x | e_k) = \lambda_k, \quad \text{kaikilla } k \in \mathbb{N}.$$

4.38. Määritelmä. Hilbertin avaruuden E ortonormitettu jono $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ on *Hilbertin kanta* avaruudessa E , jos

$$\overline{\text{span}}(\{e_n : n \in \mathbb{N}\}) = E.$$

Huomautus. Jono $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ on Hilbertin kanta jos ja vain jos $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ on maksimaalinen ortonormaali joukko avaruudessa E .

Todistus. Jos $M = \overline{\text{span}}(\{e_n : n \in \mathbb{N}\})$, niin $M \neq E \iff M^\perp \neq \{\bar{0}\}$. Tämä on yhtäpitävää sen kanssa, että löytyy $x \in M^\perp$, jolle $\|x\| = 1$. Tämä on edelleen yhtäpitävää sen kanssa, että joukko $\{x\} \cup \{e_n : n \in \mathbb{N}\}$ on ortonormaali $\iff M$ ei ole maksimaalinen orton. joukko avaruudessa E . □

Seuraava lause on keskeinen Hilbertin avaruuksien teoriassa ja sovelluksissa.

4.39. Lause. *Olkoon $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ortonormaali joukko Hilbertin avaruudessa E . Silloin seuraavat viisi ehtoa ovat yhtäpitäviä:*

- a) jono $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ on Hilbertin kanta avaruudessa E ,
- b) sisätulot $(x | e_n) = 0$ kaikilla $n \in \mathbb{N}$ jos ja vain jos $x = \bar{0}$,
- c) jokaisella $x \in E$ on $x = \sum_{n=0}^{\infty} (x | e_n) e_n$, [suppeneminen normin mielessä]
- d) jokaisella $x \in E$ on voimassa

$$\|x\|^2 = \sum_n |(x | e_n)|^2,$$

- e) jokaisella $x, y \in E$ on voimassa

$$(x | y) = \sum_n (x | e_n) \overline{(y | e_n)}.$$

Huomautus. Ehtoa e) sanotaan *Parsevalin yhtälöksi* ja ehtoa d) *Plancherelin kaavaksi*. Kohta c) taas tarkoittaa, että jokaisella $x \in E$ pätee

$$\|x - \sum_{n=0}^N (x|e_n) e_n\| \rightarrow 0, \text{ kun } N \rightarrow \infty.$$

Todistus. Käymme läpi vain tapauksen $\text{card}(\{e_n\}) = \infty$, äärellisulotteinen tapaus jää harjoitustehtäväksi.

Ortokomplementin määritelmästä $A^\perp = \{x \in E : (x, a) = 0 \forall a \in A\}$ huomataan (Miten?), että aina $\overline{A}^\perp = A^\perp$; tässä \overline{A} on A :n sulkeuma. Erityisesti, jos $M = \overline{\text{span}}(\{e_n\})$, niin b) on yhtäpitävää ehdon $M^\perp = \{0\}$ kanssa. Tämä taas on yhtäpitävää sen kanssa että $M = E$, vrt. Lause 4.26. Toisin sanoen, a) ja b) ovat yhtäpitäviä.

Helposti havaitaan, että

$$e) \implies d) \implies b).$$

Käänteiseen suuntaan osoitetaan ensin, että ehto b) implikoi c):n. Oletetaan siis, että ehto b) on voimassa. Jos $x \in E$, niin olkoon

$$\hat{x} = \sum_{n=0}^{\infty} (x|e_n) e_n,$$

mikä Besselin epäyhtälön ja Lauseen 4.36 nojalla suppenee avaruudessa E . Nyt kaikilla $k \in \mathbb{N}$

$$(\hat{x}|e_k) = \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=0}^N (x|e_n) e_n | e_k \right) = (x|e_k)$$

eli $(\hat{x} - x|e_k) = 0$ kaikilla $k \in \mathbb{N}$, joten ehdon b) nojalla $x = \hat{x}$. Olemme siis näyttäneet, että c) pätee.

Lopuksi, näytetään $c) \implies e)$. Koska oletuksen mukaan

$$x = \sum_{n=0}^{\infty} (x|e_n) e_n$$

kaikilla $x \in E$, on siis

$$\begin{aligned} (x|y) &= \lim_{N \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=0}^N (x|e_n) e_n | y \right) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{n=0}^N (x|e_n) (e_n|y) \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (x|e_n) (e_n|y) = \sum_{n=0}^{\infty} (x|e_n) \overline{(y|e_n)}. \end{aligned}$$

□

Jos Hilbertin avaruudessa E ylipäättään on Hilbertin kanta, niin selvästi E on separoituva. Käy ilmi että tämä onkin ainoa rajoite Hilbertin kannan löytymiselle.

4.40. Lause. *Jokaisessa separoituvassa Hilbertin avaruudessa E on Hilbertin kanta.*

Todistus.

1^o) Oletetaan, että $\dim E = n+1 < \infty$. Silloin avaruudella E on kanta $(x_k)_{k=0}^n$. Käyttämällä Lineaarialgebrasta tuttua Gramm-Schmidtin menetelmää voidaan tästä kannasta konstruoida uusi, ortonormaali kanta. Tämä on tehty yksityiskohtaisesti esim. Honkasalon monisteessa s. 70, Lauseessa 3.3.3.

Kertaamme tässä lyhyesti Gramm-Schmidtin konstruktion: Olkoon

$$M_q = \text{span}(\{x_j : 0 \leq j \leq q\})$$

ja merkitään $e_0 = \|x_0\|^{-1}x_0$. Osoitetaan induktiolla muuttujan q suhteen, että avaruudella M_q on ortonormaali kanta jokaisella $q = 0, 1, \dots, n$. Väite seuraa tästä, kun $q = n$.

Tapaus $n = 0$ on selvä, joten oletetaan, että avaruudella M_q on ortonormaali kanta $(e_j)_{j=0}^q$. Merkitään $y_{q+1} = x_{q+1} - P_q x_{q+1}$, missä P_q on avaruuden E ortoprojektio aliavaruudelle M_q . Koska jono (x_k) on lineaarisesti vapaa, on $y_{q+1} \neq \bar{0}$. Merkitään $e_{q+1} = \|y_{q+1}\|^{-1}y_{q+1}$. Tällöin induktio-oletuksen nojalla joukko $\{e_0, \dots, e_{q+1}\}$ muodostaa avaruuden M_{q+1} ortonormaalien kannan. Siispä väite on osoitettu.

2^o) Oletetaan sitten, että $\dim E = \infty$. Koska E on separoituva, voimme löytää tiheän jonon $(x_n)_{n=0}^\infty$. Konstruoidaan induktiolla sellainen osajono (x_{k_j}) , että kaikilla $p \in \mathbb{N}$ joukko $\{x_{k_0}, \dots, x_{k_p}\}$ on lineaarisesti vapaa ja $x_m \in \text{span}(\{x_{k_0}, \dots, x_{k_p}\})$ aina, kun $m \leq k_p$ (HT). Merkitään $y_j = x_{k_j}$. Edellisen kohdan ortonormeeraus-tekniikkaa soveltamalla jonoon (y_k) saamme konstruoitua avaruuteen E Hilbertin kannan.

□

Olkoon $(e_j)_{j \in \mathcal{J}}$ separoituva Hilbertin avaruuden kanta, missä $\mathcal{J} = \mathbb{N}$ tai $\mathcal{J} = \{1, \dots, N\}$. Tällöin jokaisella $x \in E$ on esitys

$$x = \sum_{k \in \mathcal{J}} (x | e_k) e_k.$$

Jos $(\lambda_k) \in \ell^2$ tai $(\lambda_k) \in \mathbb{K}^N$, määritellään lineaarikuvaus $T: \ell^2 \rightarrow E$ tai $T: \mathbb{K}^N \rightarrow E$ asettaen

$$T((\lambda_k)_{k \in \mathcal{J}}) = \sum_{k \in \mathcal{J}} \lambda_k e_k.$$

Tällöin T on *isomorphismi* $\ell^2 \rightarrow E$ tai $\mathbb{K}^N \rightarrow E$, sillä Lauseen 4.36 nojalla $\|Tx - Ty\| = \|x - y\|$ ja T on lineaaribijektio. Siis kaikki separoituvat Hilbertin avaruudet ovat isomorfismia vaille joko tyyppiä ℓ^2 tai \mathbb{K}^N !

4.41. Esimerkkejä.

a) *Haarin systeemi* $(h_n(x))_{n=0}^\infty$ on ehkä helpoin tapa konstruoida Hilbertin kanta avaruuteen $L^2[0, 1]$. Lähdemme tässä liikkeelle välin $[0, 1]$ karakteristisesta funktiosta ja valitsemme $h_0(x) = \chi_{[0,1]}(x)$, joka = 1, jos $x \in [0, 1]$ ja = 0, jos $x \notin [0, 1]$. Selvästi $\|h_0\|_2 = 1$.

Muut kantafunktiot valitaan seuraavasti: Jos $0 \leq j < 2^k$, olkoon $n = 2^k + j$ ja

$$\Delta_n = \left[\frac{j}{2^k}, \frac{j+1}{2^k} \right] \subset [0, 1],$$

$$\Delta_n^+ = \left(\frac{j}{2^k}, \frac{j+1/2}{2^k} \right), \quad \Delta_n^- = \left(\frac{j+1/2}{2^k}, \frac{j+1}{2^k} \right).$$

Asetetaan

$$h_n(t) = 2^{\frac{k}{2}} (\chi_{\Delta_n^+}(t) - \chi_{\Delta_n^-}(t)) = \begin{cases} 2^{\frac{k}{2}}, & t \in \Delta_n^+ \\ -2^{\frac{k}{2}}, & t \in \Delta_n^- \\ 0, & t \notin \Delta_n \end{cases}$$

kun $n = 1, 2, 3, \dots, n = 2^k + j$ kuten edellä.

(Piirrä itsellesi neljän ensimmäisen Haarin funktion h_0, \dots, h_4 kuvaajat !)

Näin muodostettu Haarin systeemi $(h_n(x))_{n=1}^\infty \subset L^2[0, 1]$ on Hilbertin kanta [Yksityiskohdat pitkähkö HT; tässä luonnosteltuna idea: Dyadisten välien Δ_n karakteristiset funktiot kuuluvat avaruuteen $\text{span}(\{h_n : n \in \mathbb{N}\}) \subset L^2[0, 1]$ (Miksi ?); tästä voidaan päätellä että avointen joukkojen karakteristiset funktiot ovat sulkeumassa $\overline{\text{span}}(\{h_n : n \in \mathbb{N}\})$; mittateorian nojalla sulkeumaan saadaan näin kaikki karakteristiset funktiot; sen jälkeen yksinkertaiset funktiot, ja lopulta koko $L^2[0, 1] = \overline{\text{span}}(\{h_n : n \in \mathbb{N}\})$].

Haarin kannan Fourier-kertoimet funktiolle $f \in L^2[0, 1]$ saadaan kaavoista

$$(f | h_0) = \int_0^1 f(t) dt, \quad (f | h_n) = 2^{\frac{k}{2}} \left[\int_{\Delta_n^+} f dt - \int_{\Delta_n^-} f dt \right].$$

Siis kun $f \in L^2[0, 1]$, niin

$$f = \sum_{n=1}^{\infty} (f | h_n) h_n$$

ja sarja suppenee avaruudessa $L^2[0, 1]$, so. L^2 -normin mielessä.

b) Haarin systeemillä on seuraava mainio skaalausominaisuus,

$$h_n(x) = 2^{k/2} h_1(2^k x - j)$$

kun $n = j + 2^k$ kuten edellä. Tällaiset skaalaus-ominaisuudet helpottavat merkittävästi numerisointia. Toisaalta Haarin systeemin pulmana on se että kantafunktiot h_n ovat epäjatkuvia. Etsittäessä kantafunktioita, jotka ovat jatkuvia tai sileitä, ja joilla on samat skaalausominaisuudet, on päädytty niin sanottuihin *wavelet*-kantoihin, joita on viime aikoina on tutkittu erityisen paljon. Näillä on myös käytännön mielenkiintoa monissa sovelluksissa, jotka liittyvät muun muassa signaalinkäsittelyyn, kuvankäsittelyyn jne. Pulmana on ettei kompaktikantajaisella waveletillä (= funktion h_1 vastineella) ole esitystä alkeisfunktioiden avulla, paitsi sarjakehitelmänä. Esitämme siksi tässä vain kuvan tyypillisestä wavelet-kannasta. Esimerkiksi, jos ψ on ao. kuvan funktio

tähän tulee kuva!!

niin funktiot $2^{j/2}\psi(2^j x - k)$, missä $x \in \mathbb{R}$ ja $j, k \in \mathbb{Z}$, muodostavat Hilbertin kannan L^2 :ssa.

c) Mainitaan lopuksi vielä pari esimerkkiä; näitä ei kuitenkaan luennoilla käsitelty. Soveltamalla Lauseen 4.40 kohdan 1^o) yhteydessä esiteltyä *Gramm-Schmidt* ortonormeeraus menetelmää polynomeihin saadaan Hilbertin kantoja moniin eri (painotettuihin) L^2 -avaruuksiin. Esimerkiksi, olkoon

$$p_n(t) = \frac{1}{2^n n!} \frac{d^n}{dt^n} ((t^2 - 1)^n)$$

n :s *Legendren polynomi*. Differentiaali- ja integraalilaskennan peruskurssin avulla tiedämme, että

$$(p_n | p_k) = \int_{-1}^1 p_n(t) p_k(t) dt = \frac{2}{2n+1} \delta_{nk},$$

missä δ_{nk} on *Kroneckerin δ -symboli* eli

$$\delta_{nk} = \begin{cases} 1, & n = k \\ 0, & n \neq k. \end{cases}$$

Merkitään $e_n = \sqrt{\frac{2n+1}{2}} p_n$. Voidaan todistaa, että saatu jono $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ on Hilbertin kanta avaruudessa $L^2([-1, 1])$. Jono voidaan konstruoida myös suoraan käyttämällä Gramm–Schmidtin menetelmää jonoon $(t^n)_{n \in \mathbb{N}}$.

d) Olkoon

$$L^2(\Omega, \rho) := \left\{ f : \int_{\Omega} |f(t)|^2 \rho(t) \, d\mu < \infty \right\}, \quad \rho(t) = e^{-t^2}.$$

Hermiteen polynomit

$$H_n(t) = n! \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} \frac{(-1)^k (2t)^{n-2k}}{k! (n-2k)!}, \quad n = 0, 1, \dots$$

muodostavat avaruuden $L^2(\mathbb{R}, e^{-t^2})$ ortonormaalien kannan. Myös tämä jono on saatu Gramm–Schmidtin menetelmällä jonosta $(t^n)_{n \in \mathbb{N}}$.

e) *Laguerren polynomit* määritellään kaavalla

$$L_n^{(\alpha)}(t) = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n+\alpha}{n-k} \frac{t^k}{k!}, \quad \alpha > -1, \quad n = 0, 1, \dots$$

Systeemi $(L_n^{(\alpha)}(t))_{n=0}^{\infty}$ on ortonormaali kanta avaruudessa $L^2(\mathbb{R}_+, te^{-t})$.